

РАДІАЦІЯ. ЯКОЮ ВОНА Є?

В ЦЬОМУ ВАЖКО Й СПЕЦІАЛІСТАМ РОЗІБРАТИСЯ

Спеціалістами підрозділу Міністерства охорони здоров'я України у липні—вересні 1992 року проводилась дозиметрична паспортизація населених пунктів району. Зокрема, з усіх відбирались проби молока, картонлі, ґрунту на наявність в них цезію-137 та цезію-134. Проводився розрахунок річної дози опромінення організму людини як зовнішнього, так і

внутрішнього на наявність цезію, стронцію, плутонію.

Згідно контрольних рівнів дані паспортизації населених пунктів не перевищують рівнів вимог по Рівненській області, затверджених обласною комісією по надзвичайних ситуаціях. І все ж читачам газети буде цікаво дізнатися про ці дані. Тому сьогодні і друкуємо їх.

Назва населеного пункту	забрудненість цезієм-137, 134		
	ґрунту Кю/км ²	молока ІЧО/Л	картонлі Н.КЮ/км
Андрусів	0,34	0,15	0,16
Бабин	0,28	0,06	0,23
Башино	0,10	0,14	0,20
Бочаниця	0,11	0,09	0,22
Бугрич	0,12	0,19	0,22
Вільгір	0,47	0,22	0,20
Вовкошів	0,32	0,53	0,20
Воронів	0,22	0,09	0,22
Воскодави	0,16	0,08	0,10
Витків	0,39	0,17	0,20
Глибочок	0,11	0,12	0,20
Горбаків	0,15	0,07	0,18
Горбів	0,28	0,06	0,29
Гоща	0,20	0,08	0,12

Дмитрівка	0,14	0,05	0,25
Дорогобуж	0,17	0,09	0,19
Дроздів	0,24	0,20	0,20
Дружне	0,50	0,10	0,15
Жалянка	0,46	0,28	0,24
Жаврів	0,12	0,08	0,16
Зарічне	0,15	0,15	0,21
Ідлін	0,08	0,15	0,19
Калесники	0,08	0,15	0,20
Красносілья	0,33	0,31	0,20
Кришички	0,34	0,23	0,21
Курозвани	0,13	0,13	0,26
Липки	0,25	0,21	0,21
Люципів	0,30	0,12	0,16
Майків	0,18	0,07	0,26
Малинівка	0,20	0,16	0,20
Малатин	0,25	0,07	0,16
Матіївка	0,31	0,17	0,25
Микулин	0,18	0,12	0,24
Мичів	0,21	0,12	0,24
Мишин	0,19	0,23	0,22
Моцони	0,22	0,27	0,26
М'ятин	0,08	0,13	0,22
Новоставці	0,15	0,24	0,20
Олексіївка	0,15	0,12	0,20
Пашуки	0,13	0,07	0,18
Підліски	0,08	0,21	0,21
Полівці	0,24	0,13	0,17
Подоляни	0,15	0,08	0,22
Посягва	0,14	0,09	0,20
Пустомити	0,29	0,11	0,25
Річиця	0,23	0,26	0,15

Рясники	0,14	0,15	0,22
Садове	0,20	0,21	0,23
Сергіївка	0,10	0,32	0,15
Симонів	0,12	0,14	0,13
Синів	0,19	0,07	0,22
Терентіїв	0,29	0,10	0,22
Томахів	0,08	0,12	0,10
Тучин	0,23	0,13	0,26
Угольці	0,19	0,16	0,19
Федорівка	0,15	0,30	0,28
Фраїївка	0,25	0,13	0,15
Чудниця	0,36	0,41	0,21
Шкарів	0,12	0,10	0,23
Ючин	0,27	0,10	0,21
Ясне	0,20	0,32	0,13

Ці цифри коментує головний державний санітарний лікар району Євген Володимирович СЕРДЮК:

— Як бачимо, рівень забрудненості ґрунту, — сказав він, — в різних місцях різний. Від 0,08 до 0,15 кюрі на квадратний кілометр в селах Олексіївка, Башино, Бочаниця, Бугрин, Глибочок, Горбаків, Дмитрівка, Жаврів, Зарічне та інших; від 0,15 до 0,20 — у Воскодавах, Гощі, Дорогобужі, Майкові, Малинівці і т. д.; від 0,20 до 0,30 — в Бабині, Вороніві, Горбові, Липках, Малатині; від 0,30 і вище — в Андрусіві, Вільгорі, Вовкошеві, Виткові та ін. Однак цього не слід боятися. Згідно контрольних рівнів харчова продукція відповідає вимогам тих рівнів, які затверджені на засіданні

комісії з надзвичайних ситуацій Рівненської облдержадміністрації 18 лютого 1993 року. Наприклад, норма забрудненості ґрунту цезієм-137 і 134 становить 1—5 кюрі на квадратний кілометр. Такої забрудненості у нас немає. Це ж стосується молока і картонлі.

Від редакції: Щоправда, цікавою є інформація, яку дають обласні служби в Київ. Всі розрахунки проводяться в беккерелях. З Кисва ж нам надходять дані в кюрі або нана-кюрі. Спробували ми розшифрувати цей кросворд. Виявляється, в 1 нана-кюрі 37 беккерелей. Дані проводяться арифметичні дії. Коротше кажучи, доступною мовою спеціалісти не дають інформації. Вона розрахована суто для вчених, а не для селянина.